

蒲瓜(扁蒲)

黃靜雪

蒲瓜生性強健，耐熱性亦強，在高溫期生育旺盛，是適於台灣週年栽培的果菜。目前市場上的蒲瓜以本地種為多，由於本地種的生長勢力較弱，品質不一，植株容易衰枯，而且容易感染病毒病，型質又雜，產量也偏低。

農友公司為了改良蒲瓜的品種，經多年不斷引種篩選和雜交育種，已育成一代交配品種「永樂」及「長樂」。



蒲瓜「長樂」

一、品種特性

(一) 永樂：

生育強盛，抗病毒病(ZYMV)，耐白粉病和蔓枯病，對於日照長短的反應不敏感，一年四季都可結果。特早生，播種後56天開始收穫，結果力特強，果實短筒型，果形端正，適食時果長約18公分，橫徑約9公分，果重約800公克。皮色白綠，品質細嫩甜美。



蒲瓜「永樂」

(二) 長樂：

植株生長強健，耐病毒病(ZYMV)及白粉病。早生，結果力強，自播種至開始採收約55-60天，適食時果皮淡綠至白綠色，長矸型，果長約30-35公分，果重約750-900公克，肉質細嫩，「長樂」在台灣中南部也可以週年栽培。

二、氣候與土壤

蒲瓜對氣候適應性很廣，在高溫或溫暖期，生育旺盛、強壯快速，所結的果實較大，在15℃以下低溫生育時較為緩慢。蒲瓜根群耐乾耐濕，對土壤的適應性很廣，一般砂質壤土至黏質壤土都適於栽培，但排水宜良好。

三、浸種催芽

蒲瓜種子播種前宜先軋開臍丘部，裝入已打孔的塑膠袋裡，以81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1,000倍稀釋液浸種消毒6小時，預防感染病菌。消毒後不用水洗，以濕毛巾包裹後，最好放在30-32℃黑暗下催芽。

四、播種育苗

種子萌芽後利用104孔穴盤裝入滿地王3號介質，播種前將介質均勻地澆濕，播種時種子平放、芽尖向下為原則，每穴播下發芽種子1粒，上覆細培養土一層，然後澆水保持適當濕度，待本葉1~2葉時定植到田間。高溫時育苗期8~10天，低溫時育苗期11~14天。



棚架栽培果實不會彎曲



搭立支架使瓜蔓攀緣，以利生長

五、栽培管理

一般栽培蒲瓜幾乎都用匍地栽培，但在家庭園中因為土地面積的限制，可搭立簡易支架栽培，使瓜蔓攀附其上以利生長。另外，長型的品種如用匍地栽培，果型必定彎曲，有損果型外觀。若庭園中有足夠的空地時，可匍地栽培短筒的品種如「永樂」，則畦幅以4公尺、株距1.2公尺為準。種植前每一植穴施下有機肥2~3公斤，和適量複合肥料作基肥。

六、整枝

由於蒲瓜以子蔓(第一次側蔓)結果為主，因此，在其栽培管理上必須進行摘心，以促進側蔓及早發生和提早結果，其主要的整枝方法有兩種：

(一) 子蔓結果整枝法：

母蔓任其生長到一定的程度摘心，母蔓10節以內所發生的子蔓都摘去，10節以後發生的子蔓，在其雌花最後發生的節上留1~2節摘心。

(二) 孫蔓結果整枝法：

母蔓6~7節摘心，促使發生子蔓(第一次側蔓)數條，然後任其生長，再由子蔓各節抽出孫蔓(第二次側蔓)，其孫蔓第一節甚至第2~4節(依品種不同，有的品種孫蔓第2節起才著生雌花)都有雌花發生能結果。

七、追肥及灌水

蒲瓜生育結果期長，結果之後每隔7天追肥一次，用台肥複合肥料43號，施肥前先行畦溝灌水後，將肥料適量撒於畦溝底部，或以葉綠精加水400倍灌注根部周圍土壤。蒲瓜莖蔓粗大、水分蒸發量大，為促進生長及果實的發育，必須適量灌水，不使莖葉萎凋。

八、採收

蒲瓜定植後，早生品種「永樂」約經40天雌花開始開花，開花後高溫期約經8~10天，低溫期約經10~12天為適收期；「長樂」蒲瓜適收期稍晚數天。



子蔓結果整枝法：子蔓1~2節摘心



孫蔓結果整枝法：孫蔓2~4節摘心