

花卉篇：粉萼鼠尾草

• 陳信安 •



↑粉萼鼠尾草「銀波」



↑粉萼鼠尾草「藍波」



↑粉萼鼠尾草「雙嬌」

粉萼鼠尾草，有著極酷似薰衣草的花形，當一大片粉萼鼠尾草綻放時，那一整片藍紫色的花海，柔美、清幽而雅緻的景象，令人佇足流連忘返。

粉萼鼠尾草屬唇形花科，株高約30~60公分。葉對生，葉片長橢圓形，葉緣有鋸齒，花序頂生。為多年生草本，國內皆作為一年生草本來栽培。

一、繁殖

以播種為主，採用點播(一穴二粒)或撒播(約1~2對葉片時再假植一次)。播種後再覆蓋一層極薄的播種介質或蛭石，並覆蓋2~3張報紙或倒置的花盆或播種盤加以遮光，並維持介質100%的溼度，發芽後即可去除遮光物。播種至發芽約3~5天，發芽後置於明亮遮雨處，育苗播種後約30~40天，株高4~6公分，約3~4對葉片即可定植。

二、栽培管理

栽培粉萼鼠尾草以排水性佳且肥沃的介質為佳，如滿地王系列栽培土。日照以全日照至稍遮蔭的環境為佳，需水性中等，待盆土表面乾燥，以手觸摸可感覺出乾燥即可澆水，切忌久濕不乾的情形發生。

粉萼鼠尾草幼苗期不耐重肥，忌過量施肥。幼苗期施用葉綠精2500倍左右(一星期一至二次，視生長情況和氣溫而定)，施肥後並用清水稍微淋洗一次。定植後視植株大小以葉綠精及甜果精(2000~1000倍)交替施用，7~10天追肥一次。成株後使用開花精1000倍催花，約7~10天一次。基肥以花彩多2~3g/株，約2個月施用一次。

粉萼鼠尾草定植約3~4星期後可摘心一次，以促進分枝和增加開花數。也可於開花前後再整枝一次，以維持株形和去除殘花。

病蟲害不多，但要防止因高溫引起的病害，做好水份管理工作。刺吸或蟲害較常見，以清香苦楝油100~200倍防治之。

三、應用

粉萼鼠尾草有藍紫色(夏天顏色會較淡)、白色和藍／白雙色三種花色。花形自然典雅，不論盆栽或造景皆十分適合。花期可盛開3~4個月以上，超長的花期為專業造景業者所喜愛。粉萼鼠尾草幾乎全年皆可栽培，但6~8月適逢盛暑和颱風季節，較不利栽培管理。